

Zo verloopt de coronavaccinatie

Stap voor stap uitgelegd




Voorlichters Gezondheid

1



Als u het coronavaccin mag hebben, dan krijgt u een uitnodiging thuis gestuurd. U kiest zelf of u gaat of niet.

2



U krijgt eerst een gezondheidscheck. Er wordt gekeken of u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

3



U krijgt de prik in uw bovenarm. Soms wordt dit in uw bovenbeen gedaan. De prik wordt gezet door een dokter of verpleegkundige.

4



Na de prik kunt u last krijgen van pijn op de plek waar de prik gezet is. U kunt spierpijn en/of koorts krijgen.

5



Na de prik moet u 15 min. ter observatie blijven. Er wordt dan gekeken of u een allergische reactie krijgt.

6



Na de prik mag u gewoon autorijden.

7



De 2e prik krijgt u 4 a 12 weken later. Dit hangt af van het vaccinmerk en allergische reacties. Als u corona heeft gehad, dan krijgt u alleen de 1e prik.

8



Vanaf 14 dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen corona.

9



U krijgt een vaccinatiekaartje mee waar al uw gegevens op staan.

10



Bijwerkingen zijn normaal. Dit komt omdat het afweersysteem van uw lichaam geactiveerd wordt.

11



Na het zetten van de prik moet u zich nog steeds houden aan de coronamaatregelen.

De meest voorkomende bijwerkingen van het coronavaccin zijn:

Pijn op plek van de prik, moeheid, hoofdpijn, spierpijn, pijn in gewrichten, rillingen, misselijkheid en overgeven, pijnlijke en opgezette lymfeklieren.

Bijwerkingen kunnen 1 tot 3 dagen duren.

Heeft u last van (andere) bijwerkingen? Geef dit door aan het Bijwerkingencentrum Lareb.

Help mee verspreiding van het coronavirus te voorkomen